



**PROSPECTO PARA EL
PACIENTE**

**C/ Portal de Foronda 54
Vitoria-Gasteiz
01010
Tfno:945009582**

**DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: ACETATO DE ALUMINIO,
SOLUCIÓN DE**

Forma farmacéutica: Gotas óticas en solución

Vía de administración: vía ótica

COMPOSICIÓN:

Sulfato de aluminio	22,50 g
<i>Excipientes</i>	
Acético glacial, ácido	8,50 ml
Carbonato de calcio	10,00 g
Agua purificada	75,00 ml
Ácido tartárico	4,50 g

ACTIVIDAD-INDICACIONES:

Se emplea en inflamaciones del oído (otitis externa).

CONTRAINDICACIONES:

Está contraindicado en caso de perforación timpánica o lesiones ulceradas.

PRECAUCIONES:

El contenido en ácido acético puede originar picor o irritación.

INTERACCIONES:

Hasta el momento no se han descrito las posibles interacciones de este medicamento.

ADVERTENCIAS:

Embarazo y lactancia :

Uso en niños : Debe utilizarse con precaución, siguiendo fielmente las instrucciones del médico.

Efectos sobre la capacidad de conducción : Hasta el momento no se han descrito los posibles efectos de este medicamento.

Otras :

POSOLOGÍA:

Se aplican 2 ó 3 gotas en el oído, tres o cuatro veces al día

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Se debe inclinar la cabeza hacia el lado contrario del oído a tratar y dejar caer 2 ó 3 gotas.

SOBREDOSIS:

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, tfno: 915620420.

REACCIONES ADVERSAS:

La posible toxicidad se debe al aluminio, pero el uso tópico conlleva pocos riesgos por la baja absorción.

CONSERVACIÓN:

Después de usarlo es preciso cerrar bien el envase. Conservar a temperatura Inferior a 30 °C y proteger de la humedad.

CADUCIDAD:

No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad indicado en el envase.