

<b>Farmacia (Nombre)</b> <b>Calle (rellenar)</b> <b>Población y CP (rellenar)</b> <b>Teléfono (rellenar)</b>	<b>PERMETRINA AL 5%</b> <b>LOCIÓN FLUIDA</b>
---	---

**Composición (por 100 g):**

Permetrina 5 g  
 Excipiente para emulsión fluida O/W, csp 100 g

(SE DEBEN DETALLAR TODOS LOS COMPONENTES, SI NO APARECEN EN EL ETIQUETADO)

**Indicaciones:**

Sarna.

**Posología y duración del tratamiento: (\*)**

Como norma general basta con una sola aplicación. En ocasiones es preciso repetir el tratamiento al cabo de 7-10 días, a criterio del médico.

**Vía y forma de administración:**

Uso tópico. El paciente debe tomar un baño caliente, en el que se enjabonará todo el cuerpo. Tras secar cuidadosamente la piel, se aplica la loción por toda la superficie corporal, desde la cabeza hasta los pies, incluido el cuero cabelludo en lactantes y ancianos. Se insistirá especialmente en los espacios interdigitales de manos y pies, axilas, ingles, genitales externos y surco anal. También deben ser tratadas las uñas porque pueden arrastrar ácaros o huevos en el rascado. Se debe dejar actuar de 8 a 14 horas, preferiblemente durante la noche. Posteriormente se retira el producto con un nuevo baño.

Usar guantes desechables en caso de que lo administre otra persona, para evitar el contagio.



Se deben tratar todas las personas que convivan con el paciente tanto si tienen contacto directo como indirecto (ropa, toallas, camas...).

**Precauciones y contraindicaciones:**

Contraindicado en caso de intolerancia a insecticidas que contengan piretrinas sintéticas.

No usar en niños menores de 2 meses.

**Efectos adversos:**

Irritación de la piel y mucosas. Puede agudizar el prurito, edema y eritema propios de la sarna. En ocasiones puede provocar erupción cutánea, pérdida de sensibilidad y hormigueo.

**Embarazo y lactancia:**

Puede utilizarse en embarazo y madres lactantes bajo estricto control médico.

**Conservación y caducidad:**

Conservar el envase bien cerrado en lugar fresco y seco y protegido de la luz.

Caducidad: 6 meses. Desechar el producto sobrante una vez acabado el tratamiento.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**SI AL LEER ESTE PROSPECTO LE SURGE  
ALGUNA DUDA CONSULTE A SU  
FARMACÉUTICO**

(\*) SE RELLENARÁ SEGÚN LO INDICADO EN LA PRESCRIPCIÓN.