

## PROSPECTO PARA EL PACIENTE

**DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO:      POLVOS DE ÓXIDO  
DE ZINC MENTOLADOS**

***Forma farmacéutica: Polvo cutáneo***

***Vía de administración:      Uso cutáneo***

### **COMPOSICIÓN:**

Mentol racémico	8,00 g
Óxido de zinc	10,00 g
Talco	37,00 g
Almidón de maíz	35,00 g

### **ACTIVIDAD-INDICACIONES:**

El mentol calma el picor y el dolor y reduce la inflamación, al aplicarlo produce en la zona una sensación de calor seguida de sensación de frío (acción rubefaciente), manifestándose seguidamente una disminución local del dolor.

Este medicamento está indicado para calmar el picor, dolor o escozor debido a picaduras, o irritación leve de la piel. También se emplea en el exceso de sudoración plantar.

### **CONTRAINDICACIONES:**

Está contraindicado en niños menores de 2 años y en caso de alergia a alguno de los componentes.

### **PRECAUCIONES:**

No se debe aplicar sobre mucosas ni en heridas abiertas. No se debe emplear en infecciones de la piel, dermatitis infectadas, inflamadas o con supuración.

Se debe evitar el contacto con los ojos, teniendo cuidado de no inhalar el polvo, por lo cual no debe aplicarse alrededor de los ojos, ni en las fosas nasales.

### **INTERACCIONES:**

No utilice otros medicamentos en la misma zona a menos que se lo indique el médico

### **ADVERTENCIAS:**

***Embarazo y lactancia*** : No debe utilizarse durante el embarazo y la lactancia sin consultar al médico

***Uso en niños*** : Está contraindicado en niños menores de 2 años.

***Efectos sobre la capacidad de conducción :***

***Otras :***

**POSOLOGÍA:**

Aplíquese 3 o 4 veces al día sobre la zona afectada.

**NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:**

Se debe aplicar sobre la piel limpia y seca

**SOBREDOSIS:**

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, tfno: 915620420.

**REACCIONES ADVERSAS:**

Ocasionalmente puede producir irritación en la zona tratada. La inhalación accidental puede causar irritación respiratoria.

**CONSERVACIÓN:**

Debe conservarse protegido de la humedad.

**CADUCIDAD:**

No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad indicado en el envase.