

PROSPECTO PARA EL PACIENTE

**DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: POMADA
ANALGÉSICA DE MENTOL Y SALICILATO DE METILO**

Forma farmacéutica: Pomada

Vía de administración: Uso cutáneo

COMPOSICIÓN:

Salicilato de metilo	15,00 g
Mentol racémico	10,00 g
<i>Excipientes</i>	
Cera amarilla de abeja	10,00 g
Lanolina	65,00 g

ACTIVIDAD-INDICACIONES:

Produce una dilatación de los vasos sanguíneos de la zona de aplicación, reduce el dolor y la inflamación.

Se utiliza para el alivio sintomático de dolores musculares y articulares.

CONTRAINDICACIONES:

Esta contraindicado en caso de alergia a los salicilatos

PRECAUCIONES:

No lo aplique sobre mucosas, ojos o heridas abiertas.

No se debe utilizar en neonatos ni en niños menores de 7 años.

La absorción sistémica puede producir reacciones de alergia a salicilatos o a cualquier otro componente de la fórmula

INTERACCIONES:

Salvo por prescripción facultativa no deben aplicarse otros medicamentos en la misma zona de la piel ni utilizar otros medicamentos que contengan salicilatos (por ejemplo: analgésicos con ácido acetilsalicílico) ya que, aunque es poco probable, podría producirse intoxicación con salicilatos.

ADVERTENCIAS:

Embarazo y lactancia : No debe utilizarse durante el embarazo y la lactancia sin consultar con el médico.

Uso en niños : No debe utilizarse en niños menores de 7 años.

Efectos sobre la capacidad de conducción : Hasta el momento no se han descrito los posibles efectos de este medicamento.

Otras :

POSOLOGÍA:

Este medicamento se aplicará sobre la zona afectada 2 ó 3 veces al día

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Es preciso aplicarlo sobre la piel limpia y seca sin frotar demasiado.

SOBREDOSIS:

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, tfno: 915620420.

REACCIONES ADVERSAS:

Puede producirse enrojecimiento cutáneo leve, picor o escozor que desaparecen a los pocos instantes. Puede producir sensibilización de la piel. Si este medicamento se absorbe demasiado y pasa a la sangre, puede producir los efectos indeseables de salicilatos.

CONSERVACIÓN:

Se debe conservar a temperatura inferior a 25 °C y protegido de la luz.

CADUCIDAD:

No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad indicado en el envase.