

Farmacia (Nombre)	RANITIDINA 15 MG/ML JARABE
Calle (rellenar)	
Población y CP (rellenar)	
Teléfono (rellenar)	

Composición (por 100 ml):

Ranitidina	1,5 g
Jarabe simple csp	100 ml
(Sacarosa: excipiente)	64 g)

(SE DEBEN DETALLAR TODOS LOS COMPONENTES, SI NO APARECEN EN EL ETIQUETADO)

Indicaciones:

Prevención y tratamiento de úlcera péptica.

Vía y forma de administración:

Vía oral.

Medir el volumen exacto (según prescripción médica) con una jeringa limpia y administrar directamente en la boca del niño con la jeringa o con una cucharita.

Se puede tomar conjuntamente con las comidas.

Posología y duración del tratamiento: (*)

La dosis en niños es 2-4 mg/Kg dos veces al día, durante el tiempo indicado por el médico.

Precauciones y contraindicaciones:

Está contraindicado en pacientes con porfiria y en aquellos con hipersensibilidad a ranitidina.

Utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia renal o hepática.



Es muy importante que respete la posología y la duración del tratamiento establecidas por su médico.

Efectos adversos:

Es un fármaco bien tolerado; puede causar reacciones adversas poco frecuentes como náuseas, diarrea, estreñimiento, dolor de cabeza, erupciones cutáneas, hipotensión y bradicardia.

Conservación y caducidad:

Conservar en frigorífico. Mantenga el envase bien cerrado. Caducidad: 7 días. Desechar el producto sobrante una vez acabado el tratamiento.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**SI AL LEER ESTE PROSPECTO LE SURGE
ALGUNA DUDA CONSULTE A SU
FARMACÉUTICO**

(* SE RELLENARÁ SEGÚN LO INDICADO EN LA PRESCRIPCIÓN.