

Farmacia (Nombre) Calle (rellenar) Población y CP (rellenar) Teléfono (rellenar)	TESTOSTERONA AL 2% EN VASELINA
---	---

Composición (por 100 g):

Propionato de testosterona	2 g
Vaselina filante, csp	100 g

(SE DEBEN DETALLAR TODOS LOS COMPONENTES, SI NO APARECEN EN EL ETIQUETADO)

Indicaciones:

Molestias asociadas a la sequedad y atrofia vulvo-vaginal en mujeres postmenopáusicas.

Vía y forma de administración:

Uso tópico vulvo-vaginal. Aplicar una pequeña cantidad de producto en la zona.

Posología y duración del tratamiento: (*)

Durante un máximo de 6 semanas se recomienda aplicar 2 ó 3 veces al día. Posteriormente es suficiente con dos aplicaciones semanales como terapia de mantenimiento.

Precauciones y contraindicaciones:

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes.
 Respetar estrictamente la duración del tratamiento indicada por el médico.

Efectos adversos:

Reacciones cutáneas: irritación, eritema y dermatitis alérgica por contacto.



Si el medicamento se emplea de la manera indicada, no debería presentar riesgos. No obstante, es posible que una absorción excesiva del producto produzca efectos adversos a nivel general.

Conservación y caducidad:

Conservar el envase bien cerrado en lugar fresco y seco. Caducidad: 6 meses. Desechar el producto sobrante una vez acabado el tratamiento.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**SI AL LEER ESTE PROSPECTO LE SURGE
ALGUNA DUDA CONSULTE A SU
FARMACÉUTICO**

(*) ~~SE RELLENARÁ SEGÚN LO INDICADO EN LA PRESCRIPCIÓN.~~