

Efectos sobre la capacidad de conducción : Aunque no se ha descrito que la administración de este medicamento a las dosis habituales produzca una reducción de la capacidad de concentración, no se debe administrar en el plazo de 2 horas antes de conducir, o manejar maquinaria peligrosa, especialmente al inicio del tratamiento.

Otras :

POSOLOGÍA:

Como inductor del sueño:

Adultos y mayores de 12 años: 2-6 cápsulas en una sola toma por la noche

En casos de ansiedad y agitación nerviosa:

Adultos y mayores de 12 años: 2-6 cápsulas tres veces al día

Este medicamento no debe administrarse durante más de 2 semanas sin control médico.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Trague las cápsulas con un vaso entero de agua. La última dosis del día debe tomarse, aproximadamente 2 horas antes de acostarse.

SOBREDOSIS:

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, tfno: 915620420.

REACCIONES ADVERSAS:

En algunos casos, puede producir dolor de cabeza, somnolencia o inquietud. En muy raras ocasiones, puede producir molestias gastrointestinales.

En algunos pacientes cuando se administra una toma inmediatamente antes de acostarse, puede producir una cierta ansiedad inicial o sueño intranquilo. Para evitar estos efectos desagradables es aconsejable administrar la última dosis aproximadamente 2 horas antes de acostarse.

En casos excepcionales puede producir trastornos del hígado, (color amarillento de la piel y color oscuro de la orina); si esto sucede debe suspenderse inmediatamente el tratamiento y consultar con el médico.

CONSERVACIÓN:

Conservar a temperatura inferior a 30 °C, proteger de la luz y la humedad.

CADUCIDAD:

No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad indicado en el envase.