



**PROSPECTO PARA EL  
PACIENTE**

**C/ Portal de Foronda 54  
Vitoria-Gasteiz  
01010  
Tfno:945009582**

**Composición (por cápsula):**

Bicarbonato de sodio 1 g  
Lactosa cs (excipiente)

(Se debe indicar el número n de cápsulas)

(Se deben detallar todos los componentes, si no aparecen en el etiquetado)

**Vía y forma de administración:**

Vía oral. Las cápsulas se toman después de las comidas con un poco de agua.

**Indicaciones:**

Alcalinizante urinario empleado en ciertas patologías renales o infecciones urinarias.

**Posología y duración del tratamiento: (\*)**

1 ó 2 cápsulas aproximadamente 1 hora después de las comidas. Es muy importante que respete la posología y duración del tratamiento establecidos por su médico.

**Precauciones y contraindicaciones:**

Si padece hipertensión, insuficiencia cardiaca o renal, propensión a retener líquidos (edemas), o si está siguiendo un tratamiento con diuréticos o dieta baja en sodio, debe consultar con el médico antes de tomar este medicamento.

**Efectos adversos:**

Los efectos secundarios no son frecuentes, salvo si las dosis son elevadas y/o el tratamiento es prolongado.

Los más frecuentes son: retención de agua, flatulencia y eructos.

Riesgo de alcalosis metabólica: debilidad, ansiedad, dolor de cabeza, vómitos, pérdida de apetito, calambres musculares.

Si se presenta alguno de estos síntomas de forma persistente debe consultar a su médico.

**Interacciones:**

Si usted está tomando antibióticos (tetraciclinas), antidepresivos (litio), antianémicos (sales de hierro); consulte con su médico puesto que el bicarbonato de sodio puede modificar la acción de éstos.

No debe tomarse con grandes cantidades de leche, productos lácteos o calcio.

**Embarazo y lactancia:**



Si está embarazada, consulte con su médico.

**Conservación y caducidad:**

Conservar a temperatura ambiente, protéjase de la humedad.

Caducidad: 1 año.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**SI AL LEER ESTE PROSPECTO LE SURGE ALGUNA DUDA  
CONSULTE A SU FARMACÉUTICO**

(\*) SE RELLENARÁ SEGÚN LO INDICADO EN LA PRESCRIPCIÓN.