

Farmacia (Nombre) Calle (rellenar) Población y CP (rellenar) Teléfono (rellenar)	FUROSEMIDA SOLUCIÓN PEDIÁTRICA 1 MG/ML
---	---

Composición (por 100 ml):

Furosemida	0,1 g
Acido cítrico	0,05 g
Fosfato disódico anhidro	2,76 g
Agua destilada, csp	100 ml

(SE DEBEN DETALLAR TODOS LOS COMPONENTES, SI NO APARECEN EN EL ETIQUETADO)

Vía y forma de administración:

Vía oral. Medir el volumen exacto (según prescripción médica) con una jeringa limpia y administrar directamente en la boca del niño con la jeringa o con una cucharita.

Se aconseja su toma conjunta con alimentos para minimizar la irritación gastrointestinal.

Indicaciones:

Diurético. Indicado en hipertensión arterial y/o edema asociado a insuficiencia cardiaca, hepática o renal.

Posología y duración del tratamiento: (*)

Como norma general, la pauta en niños es de 1 a 3 mg/Kg/día hasta un máximo de 40 mg por día, durante el tiempo indicado por el médico.

Precauciones y contraindicaciones:

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a la furosemida.



Es muy importante que respete la posología y la duración del tratamiento establecidas por su médico.

Efectos adversos:

Los más característicos son alteraciones hidroelectrolíticas como hipopotasemia, hiponatremia, alcalosis hipoclorémica, hipercalciuria e hiperuricemia.

Conservación y caducidad:

Conservar en lugar fresco y seco. Mantenga el envase bien cerrado.

Caducidad: 15 días. Desechar el producto sobrante una vez acabado el tratamiento.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**SI AL LEER ESTE PROSPECTO LE SURGE
ALGUNA DUDA CONSULTE A SU
FARMACÉUTICO**

(*) SE RELLENARÁ SEGÚN LO INDICADO EN LA PRESCRIPCIÓN.