

PROSPECTO PARA EL PACIENTE

DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: GEL ANESTÉSICO DE LIDOCAÍNA

Forma farmacéutica: Gel

Vía de administración: Uso cutáneo

COMPOSICIÓN:

Lidocaína, hidrocloreuro de	1,00 g
<i>Excipientes</i>	
Carmelosa sódica	2,00 g
Glicerol	10,00 g
Agua purificada	c.s.p. 100 g

ACTIVIDAD-INDICACIONES:

La lidocaína es un anestésico local. Este gel se utiliza para calmar el picor y dolor producido por heridas, quemaduras, picaduras, eczemas y hemorroides.

Se utiliza en exploraciones de boca, laringe, nariz y tracto urinario.

CONTRAINDICACIONES:

Esta contraindicado en pacientes alérgicos a anestésicos locales de tipo amida.

PRECAUCIONES:

No se debe aplicar sobre mucosas, ojos, ni en zonas inflamadas o infectadas de la piel.

Si se ha aplicado en la boca o la faringe no se debe comer ni beber hasta que se pase el efecto (por lo menos media hora) para evitar atragantarse o morderse la lengua.

El tratamiento de áreas extensas de la piel aumenta la absorción sistémica, por lo que el médico debe controlar este tratamiento, en especial, en pacientes con epilepsia, problemas cardiacos, hepáticos, porfiria o cuando se trate de ancianos o niños.

INTERACCIONES:

Si está en tratamiento con algún medicamento, especialmente para la hipertensión o para problemas cardiacos consulte a su médico o farmacéutico antes de usar este gel.

ADVERTENCIAS:

Embarazo y lactancia : No debe utilizarse durante el embarazo y la lactancia sin consultar al médico

Uso en niños : El tratamiento debe ser supervisado por el médico

Efectos sobre la capacidad de conducción : Hasta el momento no se han descrito los posibles efectos de este medicamento.

Otras : Contiene una sustancia susceptible de producir resultado positivo en un control de dopaje.

POSOLOGÍA:

Adultos: se debe aplicar sobre la zona afectada 3-4 veces al día.

Ancianos y niños : el médico deberá establecer la posología.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Si se ha aplicado en la boca o la faringe no se debe comer ni beber hasta que se pase el efecto (por lo menos media hora) para evitar atragantarse o morderse la lengua.

SOBREDOSIS:

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, tfno: 915620420.

REACCIONES ADVERSAS:

Ocasionalmente reacciones alérgicas como urticaria, inflamación, dermatitis de contacto y reacciones anafilácticas.

CONSERVACIÓN:

Este medicamento debe conservarse a temperatura inferior a 30 °C y protegido de la luz.

CADUCIDAD:

No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad indicado en el envase.