

Farmacia (Nombre) Calle (rellenar) Población y CP (rellenar) Teléfono (rellenar)	NITROGLICERINA AL 0,2% EN GEL
---	--

Composición (por 100 g):

Nitroglicerina	0,2 g
Excipiente para gel, csp	100 g

(SE DEBEN DETALLAR TODOS LOS COMPONENTES. SI NO APARECEN EN EL ETIQUETADO)

Vía y forma de administración:

Uso tópico anal. Aplicar una pequeña cantidad de gel sobre la zona a tratar dando un ligero masaje. Es importante utilizar siempre guantes.

Indicaciones:

Indicado en el tratamiento de las fisuras anales.

Posología y duración del tratamiento: (*)

Como norma general, se aplicará medio gramo de gel (el equivalente a un guisante) sobre la zona afectada dos veces al día durante al menos 6 semanas.

Precauciones y contraindicaciones:

Contraindicado en pacientes con alergia a la nitroglicerina o en general a los nitratos, asimismo en pacientes con infarto de miocardio reciente y shock cardiogénico.

Los ancianos, pacientes hipotensos, con hipotiroidismo y/o aquejados de insuficiencia renal o hepática, deberán ser controlados de forma más estricta por su médico durante el tiempo que dure el tratamiento.



Efectos adversos:

Son frecuentes las cefaleas leves.
Ocasionalmente sofocos, palpitaciones y rubor facial.
Raramente reacciones alérgicas dérmicas y prurito.

Embarazo y lactancia:

Contraindicado en el embarazo.
Se desconoce si se excreta en cantidad significativa por la leche materna, por lo tanto no se recomienda su uso.

Conservación y caducidad:

Conservar el envase bien cerrado en lugar fresco y seco.
Caducidad: 3 meses. Desechar el producto sobrante una vez acabado el tratamiento.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**SI AL LEER ESTE PROSPECTO LE SURGE
ALGUNA DUDA CONSULTE A SU
FARMACÉUTICO**

(* SE RELLENARÁ SEGÚN LO INDICADO EN LA PRESCRIPCIÓN.