

## PROSPECTO PARA EL PACIENTE

**DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO:            PERMANGANATO DE  
POTASIO, SOLUCIÓN AL 1/10.000 DE**

***Forma farmacéutica: Solución cutánea***

***Vía de administración:    Uso cutáneo***

### **COMPOSICIÓN:**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Permanganato de potasio | 100,00 mg      |
| <i>Excipientes</i>      |                |
| Agua purificada         | c.s.p. 1000 ml |

### **ACTIVIDAD-INDICACIONES:**

El permanganato de potasio tiene acción antiséptica y desodorante. El principal uso del permanganato de potasio es como antiséptico y astringente en infecciones de la piel en las que se produce supuración.

Se utiliza como astringente para el tratamiento del exceso de sudoración en axilas y otras partes del cuerpo, y como antiséptico para gárgaras, lavados de boca, duchas vaginales o irrigación uretral.

### **CONTRAINDICACIONES:**

Hasta la fecha no se conocen las posibles contraindicaciones de este medicamento.

### **PRECAUCIONES:**

Los pacientes con lesiones de piel grandes y ulceradas, especialmente si tienen alguna enfermedad de riñón, deben seguir cuidadosamente las instrucciones del médico, por el riesgo de que se absorba el medicamento que puede resultar tóxico.

### **INTERACCIONES:**

Hasta la fecha no se han descrito interacciones potencialmente peligrosas.

### **ADVERTENCIAS:**

***Embarazo y lactancia*** : No debe utilizarse durante el embarazo y la lactancia sin consultar al médico.

***Uso en niños*** :

***Efectos sobre la capacidad de conducción*** :

**Otras :** Si se le produce una quemadura lave inmediatamente varias veces con abundante agua y acuda a un centro médico lo antes posible.

Es necesario desechar la solución si cambia a color pardo.

**POSOLOGÍA:**

Aplicar 3-4 veces al día la cantidad necesaria para tratar la zona afectada.

**NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:**

**SOBREDOSIS:**

En caso de ingestión accidental puede producir náuseas, vómitos, coloración marrón de la mucosa bucal, daño hepático y renal, edema y depresión cardiovascular.

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, tfno: 915620420.

**REACCIONES ADVERSAS:**

El contacto con permanganato de potasio a concentraciones altas o el uso repetido de soluciones diluidas, puede causar quemaduras o úlceras en piel y mucosas. Sin embargo, la resistencia de la piel varía de unas personas a otras.

**CONSERVACIÓN:**

Conservar a temperatura inferior a 30°C y proteger de la luz.

**CADUCIDAD:**

No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad indicado en el envase. No utilice este medicamento si se observa que la solución cambia a color pardo